

CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

Idade	Vacinas	Dose	Doença Evitada
Ao nascer	BCG-ID	Dose única	Formas graves de Tuberculose
	Vacina contra Hepatite B ¹	1ª dose	Hepatite B
2 meses	Vacina Pentavalente (DTP + Hib + HB) ²	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Hemófilus influenzae b
	Vacina contra Poliomielite Inativada	1ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	Vacina oral de Rotavírus Humano ³	1ª dose	Diarréia por Rotavírus
	Vacina Pneumocócica 10	1ª dose	Pneumonia, otite, meningite e outras
3 meses	Vacina Meningocócica C	1ª dose	Doenças invasivas causadas por Neisseria
4 meses	Vacina Pentavalente (DTP + Hib + HB)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Hemófilus influenzae b
	Vacina contra Poliomielite	2ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	Vacina oral de Rotavírus Humano ⁴	2ª dose	Diarréia por Rotavírus
	Vacina Pneumocócica 10	2ª dose	Pneumonia, otite, meningite e outras
5 meses	Vacina Meningocócica C	2ª dose	Doenças invasivas causadas por Neisseria
6 meses	Vacina Pentavalente (DTP + Hib + HB)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Hemófilus influenzae b
	Vacina oral Poliomielite	3ª dose	Poliomielite (paralisia infantil)
	Vacina Pneumocócica 10	3ª dose	Pneumonia, otite, meningite e outras
9 meses	Vacina contra Febre Amarela ⁵	dose inicial	Febre Amarela
12 meses	Vacina Tríplice Viral	dose inicial	Sarampo, caxumba e rubéola
	Vacina Pneumocócica 10	reforço	Pneumonia, otite, meningite e outras
	Vacina Hepatite A	Dose única	Hepatite A
15 meses	Vacina Tríplice Bacteriana (DTP)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Vacina oral Poliomielite	reforço	Poliomielite (paralisia infantil)
	Vacina Meningocócica C	reforço	Doenças invasivas causadas por Neisseria
	Vacina Tetra Viral	Dose única	Sarampo, caxumba, rubéola e catapora
4 anos	Vacina Tríplice Bacteriana (DTP)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Tríplice viral	2ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola

Campnas Nacionais para Crianças

Menores de 5 anos Vacina oral Poliomielite

De 6 meses a menores de 2 anos Vacina Influenza (gripe)

¹ A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido.

² O esquema de vacinação é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Pentavalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP). O primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.

³ É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano entre 6 a 14 semanas de vida.

⁴ É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus Humano entre 14 a 24 semanas de vida. O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas.

⁵ A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da viagem.